

4 PASOS SENCILLOS PARA USAR ZIMHI® (inyección de naloxona HCl): PRESIONE, EMPUJE, RETIRE, GUARDE

ZIMHI SE UTILIZA PARA EMERGENCIAS CON OPIOIDES (SOBREDOSIS PRESUNTA O CONFIRMADA)¹

Lea todas las instrucciones de uso de ZIMHI en ZIMHI.com antes de usar este producto.

Llame lo antes posible para obtener asistencia médica de emergencia. **ZIMHI NO SUSTITUYE LA ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA.**



PRESIONE

PRESIONE la aguja en el muslo externo después de desenroscar el capuchón de la aguja. No toque el émbolo hasta que finalice este paso.



EMPUJE

EMPUJE el émbolo hasta que haga clic y mantenga presionado durante 2 segundos antes de retirar la aguja. Se ha administrado la dosis correcta si el émbolo se ha empujado hasta el fondo y bloquea parte del visor de la solución. Es normal que la mayor parte del medicamento permanezca en la jeringa después de haber inyectado la dosis.



RETIRE

RETIRE el protector de seguridad con una mano, con los dedos detrás de la aguja. Hágalo inmediatamente después de administrar la inyección.



GUARDE

GUARDE la jeringa usada en el estuche azul, ciérrelo y llame al 911. Entregue la jeringa de ZIMHI usada al proveedor de atención médica para su inspección y correcta eliminación.

Si la persona no responde al cabo de 2 a 3 minutos, administre una dosis adicional de ZIMHI utilizando un dispositivo nuevo.

Si administra ZIMHI a un niño pequeño, mantenga la pierna firmemente para que no se mueva mientras administra la inyección.

Si administra ZIMHI a un bebé menor de 1 año, pellizque el músculo del muslo mientras administra la inyección.

INDICACIÓN

ZIMHI es un medicamento de venta con receta que se utiliza en adultos y niños para el tratamiento de una emergencia con opioides, como una sobredosis o una posible sobredosis con signos de problemas respiratorios y somnolencia severa o incapacidad de responder. ZIMHI debe ser administrado inmediatamente por un cuidador y no sustituye a la atención médica de emergencia. Obtenga asistencia médica de emergencia inmediatamente después de la primera dosis de ZIMHI, aunque la persona se despierte.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

No utilice ZIMHI si es alérgico al hidrocloreto de naloxona o a cualquiera de los ingredientes de ZIMHI.

ZIMHI se utiliza para revertir temporalmente los efectos de los opioides. El medicamento que contiene ZIMHI no tiene efecto en personas que no están tomando opioides. Utilice ZIMHI inmediatamente si usted o su cuidador creen que hay signos o síntomas de una emergencia con opioides, incluso si no está seguro, ya que una emergencia con opioides puede causar lesiones graves o la muerte.




ZIMHI®
(naloxone HCl Injection)
5mg/0.5mL
RAPIDEZ CUANDO MÁS LA NECESITA

AHORROS Y ALMACENAMIENTO DE ZIMHI



Usted o alguien a quien cuida podría ser elegible para recibir una tarjeta de ahorros de ZIMHI. Si es elegible,* puede costar tan solo \$0 por cada receta.

Nota: Los descuentos se aplicarán automáticamente; no es necesario presentar la tarjeta física.



Mantenga ZIMHI a mano, en su estuche plástico y listo para usar en todo momento. Mantenga a temperatura ambiente, entre 68 °F y 77 °F (20 °C y 25 °C).

No exponer al calor o al frío extremo.



ESCANEE AQUÍ O VISITE ZIMHI.COM PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, INCLUIDO UN VIDEO SOBRE CÓMO USAR ZIMHI

*Quienes utilizan Medicare, Medicaid o cualquier otro programa de atención médica federal o estatal no son elegibles para recibir ahorros conforme a las leyes federales y estatales. Los ahorros y reembolsos en las recetas de ZIMHI deben procesarse en una farmacia participante. Pueden aplicarse beneficios máximos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

Los familiares, cuidadores u otras personas que puedan tener que usar ZIMHI en una emergencia con opioides deben saber a dónde se encuentra el producto y cómo administrarlo antes de que se produzca una emergencia con opioides.

Obtenga asistencia médica de emergencia inmediatamente después de administrar la primera dosis de ZIMHI. Se puede realizar respiración de rescate o RCP mientras se espera la asistencia médica de emergencia.

Los signos y síntomas de una emergencia con opioides pueden reaparecer varios minutos después de la administración de ZIMHI. Si esto sucede, administre inyecciones adicionales utilizando una nueva jeringa precargada de ZIMHI cada 2 o 3 minutos y siga controlando atentamente a la persona hasta que reciba asistencia de emergencia.

ZIMHI puede causar efectos secundarios graves, como síntomas repentinos de abstinencia de opioides, que pueden incluir: dolores corporales, fiebre, sudoración, moqueo nasal, estornudos, piel erizada, bostezos, debilidad, escalofríos o temblores, nerviosismo, inquietud o irritabilidad, diarrea, náuseas o vómitos, calambres estomacales, aumento de la presión arterial o aumento de la frecuencia cardíaca.

Otros efectos secundarios comunes de ZIMHI incluyen mareos y enrojecimiento en el lugar de la inyección.

En lactantes menores de 4 semanas que han estado recibiendo opioides de forma regular, el retiro repentino de opioides puede poner en peligro la vida si no se trata de la forma correcta.

Los signos y síntomas incluyen: convulsiones, llanto más de lo habitual y aumento de los reflejos.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de ZIMHI. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre efectos secundarios.

Para informar PRESUNTAS REACCIONES ADVERSAS, comuníquese con Adamis Pharmaceuticals Corporation al 1-800-230-3935 o con la FDA al 1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch.

Consulte la Información de prescripción y la Información para el paciente completa en ZIMHI.com.

Referencia: 1. ZIMHI. Información de prescripción. Adamis Pharmaceuticals Corporation; 2021.



ZIMHI es una marca comercial de Adamis Pharmaceuticals Corporation.
©2022 USWM, LLC. Todos los derechos reservados. USWMZIM-00140 4/23



ZIMHI®
(naloxone HCl Injection)
5mg/0.5mL
RAPIDEZ CUANDO MÁS LA NECESITA